


6.11.20



טבלה 4

הקבוצה (יחידות יחסיות)	wieco זוני ניקל בתמייה (грамм/цмх)	משקל ממוצע של זקנים שניצרו (грамм/цмх)
א	0	10
ב	2	12
ג	10	15
ד	20	15.5

ענה על השאלות 14-12.

12. עליך להציג בדרך גրפית את תוצאות הניסוי המוצגות בטבלה 4.

א. מהו סוג ההצגה והופתת המתאים ביותר לתיאור התוצאות, גרעין או דיאגרמת עמודות? נמק את תשובתך.

ב. לשוטך יי מילימטרי בספק המצער. האג עלי בדרך גրפית את תוצאות הניסוי שבטבלה 4.

**गראף רציף כי המשתנה הבלתי תלוי -
ריכוזים - הוא רציף.**

בחינת בגרות במעבדה - 2013

בחינה לתלמידים, ש כוללת תירגול חלקו של ביצוע המעבדה, ושאלות לבחינה.

לכל מבחן מעבדה יש 3 חלקים - א', ב' ו- ג'.

שםו לב **לפתוח** בתחילת כל חלק.

להציג את כל מה שחשב.

מבנה בחינת בגרות מעבדה

מטרת חלק א' - הכרת שיטת עבודה לניסוי - הקדמה לניסוי.

מטרת חלק ב' - ביצוע ניסוי על ידי התלמיד. **הכנת טבלה**.

מטרת חלק ג' - ניסוי של חוקרים = **אנטן**. יש קשר לחלק ב'.

לפעמים שואלים מה הקשר בין ניסוי התלמיד לניסוי החוקרים.

הgrp מופיע כאן.

הנחיות לעבודה באותיות, שאלות לצריך לענות במספרים.

בחינת בגרות במעבדה לתלמידי 5 י"ל - מבחן י"ב – 11.9.20

בעיה 2 12 שאלות, לכל שאלה ערך

מספריו שונה. ניקוד שונה.

בבעיה זו תבדוק את ההשפעה של גורמים שונים על תאי שמרים.
השאלות בשאלון זה ממוספרות במספרים 16-29. מספר הנקודות לכל שאלה רשום בסופה.
ענה על כל השאלות במחברת.

חלק א – הכרת שיטה לבדיקת הסביבה התוך-תאית (חומרית/בסיסית)

- א. לרשותך מבחנה ובה תמייסת חומרית, מקלונים למדידת דרגת H_c ומלקוטה (פינצטה).
- בעדרת המלקוטה, טבול מקלון בנוזל שבמבחן וקבע את דרגת ה-H_c של התמייסה. רשום את התוצאה במקום המתאים בטבלה 1.
- ב. באמצעות עט לרשום על זכוכית, רשום "בסיסי" על פיפטה בנפח של 5 (או 10) מ"ל ועל מבחנה ריקה.
- על שולחן כל' ובו תמייסת בסיסי. באמצעות הפיפטה העבר 5 מ"ל תמייסת בסיסי למבחן "בסיסי".
- באמצעות מקלון למדידת דרגת H_c, קבע את דרגת ה-H_c של התמייסה שבמבחן, ורשום את התוצאה במקום המתאים בטבלה 1.
- ג. על שולחן בקבוקון עם טפי, ובו תמייסת האינדיקטור אדום ניטרלי המשמש אינדיקטור (חומר בווחן לחומרית ולבסיסי).
- הוסף 5 טיפות אינדיקטור לכל אחת מן המבחנות "חומרית" ו"בסיסי".
- התבונן בצבע שהתקבל בתמייסות, וענה על שאלה 16.

ענה על שאלה 16.

16. העתק למחברתך את טבלה 1. כתוב במקום המתאים בטבלה 1 שבמחברתך את צבע התמיסה שהתקבל
לאחר הוספת האינדיקטור. (5 נקודות)

טבלה 1

הטמיסה הנבדקת	דרגת ה-H ₂ O	צבע התמיסה
לאחר הוספת אדום ניטרלי		
חומרה		
בסיום		

חובה להעתיק את הטבלה למחברת/
לדףים.
הטופס לא תמיד מועבר עם הבדיקה.

חומרה 0 סגול
בסיום 11 כתום בהיר

אין חומציות 0. פחות סגול - יותר ורוד - אדום.
כל תשובה מקבלת את מלוא הנקודות!!! - לכל צבע.

חומרה צבעי אדום, ורוד, סגול.
בסיום - צהוב, כתום.

צריכה להיות התאמה בין הצבע לבין חומרה או בסיום.
חומרה - 6-0, בסיס 8-14. 7 - ניטרלי.

הדגשה.



בחינת בוגרות במעדרת 5 ינואר תשע"ג
שאלון 043008

- ד. לרשותך כי וגו' כמות שקופה של תא שמרים. שמרים הם פטריות חד-תאיות.
- באמצעות משורה, העבר 50 מ"ל מתמיסת הבסיס לכלי עם השמרים.
 - בעזרת כפית לשימוש חד-פעמי, עריבב את השמרים כך שלא ישארו גושים. לאחר העריבוב מתקובל תרחיף.
 - רשום על הכלי "תרחיף שמרים בבסיס".

- ה. רשום "শমৰিম" על פיפטה של 5 (או 10) מ"ל. רשום "শমৰিম" בבסיס על מבחנה ריקה.
- באמצעות הפיפה "শমৰিম", העבר 5 מ"ל מתרחיף השמרים ל מבחנה "শমৰিম בבסיס".
 - באמצעות מקלון חדש למדידת דרגת H₂K, קבע את דרגת ה-H₂K של התרחיף, ורשום את התוצאה:

- ו. הסוף 10 טיפות אינדיקטור לבחינה שבת התרחיף השמרים, סלטל אותה קלות, והמתן חצי דקה.
- התבונן בצבע התרחיף, ורשום לאיזה צבע התרחיף דומה יותר: לצבע של תמיסת הבסיס או לצבע של תמיסת החומצה, לאחר הוספה אדום ניטרלי למבחן (כפי שרשמה בטבלה 1)
 - באמצעות מקלון חדש בדוק שוב את דרגת ה-H₂K של התרחיף, ורשום את התוצאה:

הערה: לכואורה התוצאות שקיבלת – צבע התרחיף ודרגת ה-H₂K של התרחיף – אין תואמות זו לזו.
בדיקות בהמשך יסייעו לך לישב את האי-התאמה.

לדעתך: אדום ניטרלי הוא דרך הקروم הברני של תאים חיים, אך איו פוגע בתהליכי בתא.

על דבר שמופיע במסגרת לדיונך הוא הכח חשוב. צריך להשתמש במידע אחר כר.

ענה על שאלה 17.

17. בתרחיף השמורים שהכנת אפשר להגדיר שתי סביבות מימיות: סביבה תור-תאיתית (בתוך תא **השומר**) וסביבה **חוץ-תאיתית**.

א. על פי הבדיקה שערכת בסעיף ה, האם הסביבה החוץ-תאיתית היא סביבה בסיסית? נמק. (3 נקודות)

ב. בסעיפים ה-ו השתמשת בשתי שיטות לבדיקה חומציות או בסיסיות. איזו מן השיטות מתאימה יותר לבדיקה חומציות או בסיסיות של הסביבה התור-תאיתית? נמק. (4 נקודות)

- ד. על שולחן מבחנה ומשפר שבתוכו ניר סיכון.
- רשום על המבחןת "טסנין".
 - הכנס את המשפט עם ניר הסיכון ל מבחנה.
 - טלטל את המבחןת עם תרחיף השמורים והאינדיקטור (שהכנת בסעיף ו), ושפוך את התרחיף לניר הסיכון שבמשפר. הנוזל ישיטן ל מבחנה הוא **טסנין**.

סיכון התרחיף ימשך דקota אחת. בזמן זה עבור **לחלק ב**, ובוצע את ההוראות בסעיפים י-יא.

ח. לאחר שהסתומים **טסנין**, הוציא את ניר **טסנין** מן המשפר ופרהו אותו על ניר מגבת (אם ניר **טסנין** נקרע מעט, אין לך חשיבות).


- הוסף לתמונת **טסנין** שבמבחןת 2-3 טיפות אינדיקטור אדום ניטרי.

17. א. כן 30%. נימוק - יודעים לפי שאלה 16 שבסיס זה 11.

כאשר נסרים את ההסבר לכל המעבדה/ חלק - **עבודת הגשה** במודל של כל התשובות. מוקלדות.

חשוב לענות לפי הסדר.

17. ב. להבין את שיטת המדידה. 2 **שיטות מדידה** - 1 - **הוספה אינדיקטור**
לתרחיף - בודק בתוך התא. 2- **מקלון - בודק מה שיש מחוץ לתא.**



ענה על השאלות 18-19.

18. א. מהו צבע התסנין? קבע, על פי הצבע, אם התסנין הוא חומץ או בסיסי. (2 נקודות)
ב. מהו הצבע של תא השמרים שלא הסתנו ונסארו במרכז ניר הסינן? (2 נקודות)

19. א. הסבר כיצד הסינן (שביצעת בסעיף ז') ותוואותיו (בתשובהך לשאלה 18) מאפשרים להבחין בין ה-H₂K
בסביבה החוץ-תאית ובין טווח ה-H₂K בסביבה החוץ-תאית. (3 נקודות) **פנימ**
ב. הסבר כיצד תוצאות הבדיקות שהציגת בתשובהך לשאלה 18 מעידות על קיום הומיאוסטזיס בתאי
שמרים. (5 נקודות)

ט. העבר לכלי פסולת את ארבע המבחנות שהשתמשה בהן בחלק א.

חזר לחיק ב לסעיף יב

18. א - מה זה **תסנין**? על הניר נשארים תאים, מה שיורד ל מבחנה - **תסנין**.
לרשום את הצבע - **כתום** - התסנין בסיסי. **לא לחת נמוק**. לא ביקשו שאלה.
18 ב - אדום.
אם **יש** הוספה מידע, שלא נדרש והמידע שגוי - יורידו **נקודות**.
19. א. על ניר הסינן נשארו התאים והופרדו מהתסנין, שנוזל שירד למיטה.
חוץ תא - **תסנין**, הנוזל שירד למיטה. פנים תא - **תאים על ניר הסינן. לחת הסבר מלא**.
ב. הגדרה להומיאוסטזיס - הסבר כללי + התיחסות לניטוי.
הבסיס שהוספנו מחוץ לשמרים - חדר או לא חדר לתאים.
מנגןון של בופר - חומר שמנטראל חומציות או בסיסיות.

חלק ב - השפעת אתנול על תאי שמרים

לידיעות: אתנול (אלכוהול / "כהול") הוא חומר הממס שומניים וגם גורם **לדנטוֹרָטִיתָה** של חלבונים.

- . סמן שיש מבחנות במספרים 1-6.
- טلطל את הכליל "תרחיף שמרים בסיס" (שהכנת בסעיף ד), ובאמצעות הפיטה "שמרים" העבר 4 מ"ל תרחיף שמרים לכל אחת מה מבחנות 5-1.
(שים לב: אל-טסיפי תרחיף שמרים ל מבחנה 6).
 - רשום "מים" על פיטה בנצח של 5 (או 2) מ"ל.
 - באמצעות הפיטה "מים" הוסף 4 מ"ל מים מזוקקים ל מבחנה 6.

יא. לכל אחת מן המבחנות 1-6 הוסף 5 טיפות אדום ניטרלי. אדום ניטרלי - אינדיקטור

- טلطל קלות את המבחנות.
- רשום במחברתך את צבע הנוזל בכל אחת מן המבחנות.

חוור לסעיף ח, וענה על שאלות 18-19.

יב. על שולחן מבחנה שבה מים מזוקקים, ומבחןה שבת תמייסת אתנול ברכיב כ- 70%.
בעזרת הפיטה "מים", הוסף מים מזוקקים ל מבחנות על פי הפירוט בטבלה 2.

- יג.** רשום "אתנול" על פיטה של 5 (או 2) מ"ל.
- בעזרת הפיטה "אתנול", הוסף אתנול ל מבחנות על פי הפירוט בטבלה 2.
 - סגור את המבחןה שבה אתנול לאחר השימוש בה.

רכיבי אתנול - המשטנה הבלתי תלוי - הגורם המשפיע



טבלה 2

המבחן	נפח המזוקקים (מ"ל)	נפח המים המודוקים (מ"ל)	נפח אטנול 70%
1	2.0	2.0	0
2	1.5	1.5	0.5
3	1.0	1.0	1.0
4	0.5	0.5	1.5
5	0	0	2.0
6	0	0	2.0

יד. טלטל את המבחנות, רשם את השעה: _____, והמתן שתי דקות.

טו. לאחר 2 דקות בדוק את צבע התרחיף בכל אחת מן המבחנות, ורשם מיד את התוצאות במחברתך.

שיעור בית - הכנת טבלה חדשה לשאלה 21

הגורם המשפייע - ריכוז אטנול עננה על שאלות 20-25.

הגורם המשפייע - תהליך ביולוגי - שינוי צבע בתאי השמרים בעקבות חדרות קром בדיפוזיה.

20. חשב את הריכוז הסופי של האטנול בכל אחת מן המבחנות. (4 נקודות)

שים לב: הריכוז ההתחלתי של האטנול היה 70%, והנפח הסופי במבחנות הוא 6 מ"ל.
(בчисוביך תוכל להתעלם מהנפח של 5 טיפות אדום ניטרלי).

21. א. הכן במחברתך טבלה, וסכם בה את מעורר הניסוי שבייצעת בחלב ב ואות תוציאותיו (מבחנות 1-6).
כלול בטבלה גם את צבע הנזול בכל אחת מן המבחנות בתחילת הניסוי כפ"י שרשמת במחברתך
בסעיף יא. (6 נקודות)

ב. הוסף כוורת מתאימה לטבלה. (נקודה אחת)

20

מספר הבדיקה	טבלה 1: נפח אטנול (מ"ל)	טבלה 2: נפח המים המזוקקים (מ"ל)	טבלה 3: המבנה
1	0	2.0	+
2	0	2.0	+
3	0.5	1.5	-
4	1.0	1.0	+
5	1.5	0.5	+
6	2.0	0	+
7	2.0	0	+

חישוב ריכוזים

נתוניים:

ריכוז אטנול התחלתי - 70%
נפח כל מבחנה - 6 מ"ל.

נושא: $v_1v_2=c_1c_2$
V- נפח. C - ריכוז.

$$\textcircled{Z} \quad x = \frac{30 \times 0.5}{6} = 5.8\%$$

$$\textcircled{3} \quad x = \frac{70 \times 10}{6} = 11.6$$

שיעור בית - הכנות טבלה חדשה לשאלה 21 - במחברת
הגורם המשפיע - ריכוזי אטנול
הגורם המושפע - תהליכי ביולוגיה - שינוי צבע בתאי השמרים בעקבות
חדיות קром בדיפוזיה.

מערך הניסוי:
מרכיבי הניסוי

הכנות טבלה
לא לשכוך כוורת.

עד CAN - 6.11.20