


שאלה מס' 1

אופנוע משטרתי נוסע על כביש מהיר ישר, בנסיעה שגרתית במהירות קבועה של 90 קמ"ש. מכונית חולפת על פני האופנוע גם במהירות קבועה וגודלה 180 קמ"ש ובאותו כיוון נסיעה. באותו רגע שהמכונית חלפה על פניו, השוטר פותח במרדף אחרי המכונית מפרת החוק, בתאוצה קבועה של 5 m/s^2 . האופנוע יכול להגיע למהירות מרבית של 216 קמ"ש.



א. (1) כמה זמן נדרש לאופנוע כדי להגיע למהירות זהה למהירות המכונית?

(5 sec)

(2) מה מרחקו של האופנוע מן

המכונית ברגע זה? (62.5 m)

(5 נק')

ב. בתרשים משורטטים במערכת צירים

משותפת גרפים, a ו-b, של מהירות

המכונית ושל מהירות האופנוע כפונקציה של הזמן. ציין לאיזה כלי רכב שייך כל גרף ומהן הערכים של הזמנים t_1 ו- t_2 ושל המהירויות v_0 , v_1 ו- v_2 . ($t_1=5 \text{ sec}$, $t_2=7 \text{ sec}$, $v_1=50 \text{ m/s}$, $v_2=60 \text{ m/s}$)



(4 נק')



ג. לאחר כמה זמן משיג האופנוע את המכונית? (12.25 sec) לא לשכוח שהתנועה של

(4 נק')

האופנוע מורכבת משני חלקים.

ד. איזה מארבעת התרשימים הבאים מציג נכון את גרפי ההעתק של המכונית ושל האופנוע מרגע תחילת המרדף ועד רגע שהאופנוע משיג את המכונית? נמק תשובתך. (3 נק')





(תרשים 4)

למשטרה הסתבר שנהג המכונית הוא מחבל ולכן הורו למסוק משטירתי לפגוע במכונית באמצעות ירי טיל. נתון כי המסוק מרחף במנוחה ביחס לכביש, מעל הכביש בגובה 180m וברגע הירי הוא נמצא במרחק אופקי של 240m מאחורי המכונית. המסוק משגר את הטיל בכיוון אופקי לעבר המכונית.

ה. באיזו מהירות יש לשגר את הטיל כדי שיפגע במכונית, אם ידוע כי המכונית לא שינתה את כיוון תנועתה והמשיכה לנסוע ב- 180 קמ"ש ? (90 m/s) **לא לשכוח שגם המכונית נעה.**


(5 נק')

ו. מהי מהירות הפגיעה (גודל וכיוון) של הטיל במכונית? פרט חישוביך. $(108 \text{ m/s}, -33.7 \text{ deg})$

(4 נק')

שאלה מס' 2

תלמיד עושה ניסוי לאישוש החוק השני של ניוטון. במערכת הניסוי (ראה תרשים) תיבה מלבנית עליה מותקן חיישן כוח, סל המחובר בחוט לחיישן הכוח, חיישן תנועה סיבובית, משקולות, מסילה אופקית. החוט כרוך סביב הגלגלת של חיישן התנועה הסיבובית. חיישן הכוח מודד את גודל מתיחות החוט וחיישן התנועה הסיבובית מודד את התאוצה. החיכוך בין התיבה למסילה אינו זניח.




התלמיד עשה 5 מדידות, כאשר בכל מדידה הוא שינה את מספר המשקולות בסל. תוצאות המדידות מרוכזות בטבלה:

1.14	0.86	0.58	0.30	0.02	תאוצת המערכת $a(m/s^2)$
1.27	1.10	0.94	0.77	0.60	גודל מתיחות החוט $T(N)$

א. התייחס לתיבה עם חיישן הכוח כאל גוף אחד וסרטט את תרשים כל הכוחות הפועלים על גוף זה. רשום את שמו של כל כוח ואיזה גוף מפעיל אותו. (על השרטוט)
(4 נק')

ב. פתח ביטוי לתאוצת המערכת, a , כפונקציה של מתיחות החוט, T , מסת התיבה יחד עם חיישן הכוח, m , מקדם החיכוך בין התיבה למסילה, μ , ותאוצת הנפילה החופשית, g .
 $(a = T/m - \mu g)$ (5 נק')

ג. סרטט גרף (המורכב מגרף פיזור וקו מגמה) המתאר את התאוצה כפונקציה של גודל מתיחות החוט. סמן בגרף את נקודות החיתוך עם שני הצירים.



(4 נק')


ד. חשב על פי הגרף שסרטטת את:

(1) מסת התיבה, m , ($m=0.6 \text{ kg}$)

(2) מקדם החיכוך הקינטי בין התיבה לבין המסילה. (0.1)


(6 נק')

ה. באותה מערכת צירים בה סרטטת את הגרף הנדרש בסעיף ג', הוסף את הגרף שהיה מתקבל אילו מסת התיבה יחד עם חיישן הכוח הייתה גדולה פי 2. בגרף שהוספת התייחס לנקודות החיתוך עם הצירים ולשיפוע שלו והסבר כיצד קבעת אותם עבור הגרף שהוספת. (6 נק')



שאלה מס' 3

גוף קטן מאד, שמסתו m יכול לנוע ללא חיכוך על גבי שולחן אופקי. במערכת המתוארת בציור גוף זה קשור בחוט שמסתו זניחה לגוף אחר, שמסתו M , התלוי באוויר. החוט עובר דרך חור קטן בשולחן. החיכוך זניח ואורך החוט קבוע.



א. מקנים למסה m מהירות v_0 בכיוון ניצב לחוט, כך שהמסה השנייה M נשארת במנוחה.

(1) הראה שבמערכת זו מתקיימים התנאים לתנועה מעגלית קצובה. (תאוצה ניצבת למהירות, רדיוס קבוע,

$$(2) \text{ הוכח שרדיוס הסיבוב נתון על ידי הביטוי: } r_0 = \frac{mv_0^2}{Mg}$$

(9 נק')

ב. במקרה אחר, מקנים למסה m מהירות כפולה ($2v_0$) בניצב לחוט, וגם הפעם הגוף שמסתו M נשאר במנוחה.

(1) האם במקרה זה הגוף שמסתו M נמצא בנקודה גבוהה יותר, נמוכה יותר או באותו הגובה

בהשוואה למקרה של מהירות התחלתית v_0 ? נמק. (M גבוהה יותר כי ...)

(2) האם תדירות הסיבוב, f , גדולה יותר, קטנה יותר או שווה לתדירות שהייתה במקרה

$$\text{שהמהירות התחלתית הייתה } v_0? \text{ נמק. } (f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{Mg}{mr_0}} \Rightarrow \dots)$$

(8 נק')

הערה: הסעיף הבא אינו תלוי בסעיפים הקודמים.

ג. הגוף שמסתו m מסתובב במהירות v_0 קבועה בגודלה. ברגע מסוים הוא מתנגש התנגשות

מצחית אלסטית (לחלוטין) בגוף אחר שמסתו m_1 , שהונח בדרכו (במנוחה).

(1) כתוצאה מההתנגשות, מהירותה של m קטנה פי 3. בטא את m_1 באמצעות m .

$$(m_1 = 1/2m)$$

(2) רשום ביטוי לגודל המתקף שפעל על כל אחד משני הגופים שהתנגשו. ($J \text{ on } m = -2/3mv_0$)


$$J \text{ on } 1/2m = 2/3mv_0$$

(8 נק')


שאלה מס' 4

כוח $\vec{F}$ מושך ממנוחה גוף שמסתו $m = 8\text{kg}$ במעלה מישור משופע. הכוח מקביל למישור המשופע. זווית השיפוע של המישור היא $\alpha = 30^\circ$ (ראה תרשים 1). הנח כי אין חיכוך בין הגוף למשטח.

בתרשים 1 מוגדר ציר x במעלה המישור המשופע, שראשיתו בנקודה ממנה מתחיל הגוף לעלות.



בגרף שלפניך (תרשים 2) מתואר גודל הכוח, F , כפונקציה של המקום, x :



תרשים 2

- א. (1) העתק למחברתך את תרשים המישור המשופע ועליו הגוף במהלך עלייתו. הוסף תרשים כוחות הפועלים על הגוף במשך שבעת המטרים הראשונים.
(2) חשב את עבודתו של כל אחד מהכוחות שפועלים על הגוף, לאורך 3 המטרים הראשונים. $(W(F)=375\text{J}, W(mg)=-120\text{J}, W(N)=0)$ (7 נק')
 - ב. חשב את מהירות הגוף לאחר שלושת המטרים הראשונים. (7.98m/s) (5 נק')
 - ג. באיזו נקודה (במהלך העלייה) הייתה מהירות הגוף מרבית? נמק. (6.6m) (3 נק')
 - ד. חשב את מהירות הגוף לאחר 7 מטרים. פרט שיקוליד. (13.18 m/s) (5 נק')
 - ה. הכוח F פסק לפעול אחרי 7 מטרים. חשב את הגובה המרבי אליו הגיע הגוף על המישור המשופע. הנח כי המישור המשופע מספיק ארוך, כך שהגוף לא מגיע לקצה העליון שלו. $(H=12.18\text{m})$

(5 נק')

שאלה מס' 5

על כוכב לכת S בגלקסיה רחוקה נבנה כביש בצורה מעגלית העובר לאורך קו המשווה של הכוכב. רדיוס הכוכב: $R_s = 1.53 \cdot 10^7 \text{ m}$. כאשר מכונית שמסתה 100 ק"ג נוסעת על כביש זה במהירות שגודלה $v = 1.25 \cdot 10^4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, המכונית הפעילה על הכביש כוח שגודלו 980N בכיוון מאונך לכביש.

א. חשב מהי תאוצה הכבידה, g_s , על פני הכוכב S. (20 m/s^2)

(5 נק')

ב. חשב את מסת הכוכב. $(7E25 \text{ kg})$

(5 נק')

המכונית מצליחה להגביר את מהירותה עד שהופכת לחללית, ממריאה ומתייצבת כלוויין, במסלול מעגלי סביב הכוכב, בדיוק מעל קו המשווה. רדיוס המסלול כפול מרדיוס הכוכב. ג. מהו גודל הכוח שמפעיל אסטרונוט בחללית על הכיסא עליו הוא יושב, אחרי שהחללית התייצבה במסלולה סביב הכוכב? נמק. (אפס)

(5 נק')

ד. חשב את מהירותה של החללית במסלולה. פרט שיקולך. (12.35 km/s)

(5 נק')

אחד מתושבי הכוכב S, ערך תצפיות על מספר רב של לוויינים החגים סביב הכוכב ושרטט גרף המקשר בין זמני מחזור של הלוויינים לבין רדיוסי סיבובם. הוא קיבל גרף לינארי. ה. מהם המשתנים המתוארים בכל ציר של גרף זה ומהן יחידות המידה שלהם. נמק תשובתך.

(חוק 3 של קפלר ...)

(5 נק')